

BioPlus[®] 2B

LECHONES DESTETADOS

**Alimento probiótico respaldado
por investigaciones científicas**

- Mejora el incremento de peso diario
- Mejora la salud intestinal
- Mejora la utilización de alimentos

CHR HANSEN

Improving food & health

BioPlus® 2B


BioPlus® 2B contiene cepas naturales cuidadosamente seleccionadas de *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformis*. Una alimentación diaria de BioPlus® 2B promueve la estabilidad de la microflora intestinal, aumenta la disponibilidad de nutrientes y reduce la carga de patógenos. El beneficio general es una mejor salud intestinal y una mejor absorción de nutrientes, lo que a su vez mejora la conversión alimenticia y el aumento de peso y reduce la mortalidad posterior al destete.

El destete es un período de mucho estrés para un cerdo. Se cambia la alimentación con leche por un alimento pildorizado o triturado. Este cambio en la dieta genera estrés, y una de las principales consecuencias es la baja ingesta de alimentos y un desequilibrio microbiano en el intestino. Esto genera un menor rendimiento.

Garantiza la ingesta de alimento

Se demostró que cuando se complementa con el alimento desde la primera etapa de alimentación y cría, BioPlus® 2B aumentó significativamente la ingesta de alimentos.

Figura 1 - BioPlus® 2B afectó de manera significativa la ingesta diaria de alimentos desde el día 1 al 14 después del destete (CH80269)




Mejora la ganancia diaria promedio y la tasa de conversión alimenticia

Se ha demostrado que BioPlus® 2B estabiliza los intestinos durante el destete y bajo condiciones estresantes en general. De esta manera, BioPlus® 2B reduce los efectos negativos del destete, mejora la producción de la primera etapa de la alimentación y cría, y promueve un alto rendimiento en términos de mejor incremento de peso diario promedio y tasa de conversión alimenticia en la primera etapa de alimentación y cría. Además, BioPlus® 2B también ha demostrado que mejora la vitalidad en la primera etapa de alimentación y cría.


Incremento diario promedio

Figura 2 - Impacto de BioPlus® 2B en el incremento de peso diario de 1 a 42 días post destete (CH80269)



Conversión alimenticia

Figura 3 - Mejora de conversión alimenticia en cerdos de 1 a 42 días posteriores al destete (CH80274)





BioPlus® 2B disminuye mortalidad.

Un cerdo estresado es más propenso para que se genere una reproducción perjudicial de patógenos que pueden aumentar la tasa de mortalidad. Se ha demostrado que utilizar BioPlus® 2B para alimentar a los lechones en la primera etapa de alimentación y cría disminuye la tasa de mortalidad. También se ha demostrado que BioPlus® 2B mejora la calificación fecal debido a la modulación positiva de la microflora intestinal.

Mortalidad desde el día 1 a 42 posterior al destete

Figura 4 - Disminución de la mortalidad desde el día 1 a 42 después del destete debido al complemento de BioPlus® 2B (CH80269)



Aplicación: BioPlus® 2B se incluye en la alimentación en forma de esporas resistentes a la humedad y al calor, lo que permite que las bacterias sobrevivan al proceso de peletización y a las acciones de los ácidos orgánicos, así como a altos niveles de zinc y de cobre. Aplicar 400 - 1000g de BioPlus® 2B por 1 tonelada de alimento.

El producto puede administrarse con una premezcla o mezclarse directa mente con el alimento completo antes del proceso de pildorización.

Envasado: Bolsa de 20 kg con 20 a 60 toneladas métricas de alimentación a la tasa de inclusión recomendada.

Uso: Para premezcla o pienso compuestos.

Contenido: *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformis*.

WWW.CHR-HANSEN.COM/ANIMAL-HEALTH